

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法  
標準プロトコール／治療計画書 [No.M037]  
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

## 乳腺 olaparib

### <対象>

- ・ がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤及びタキサン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法歴のある患者を対象とすること。
- ・ BRCA 遺伝子変異陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳がんにおける術後薬物療法

### <標準プロトコール>

day1	day8	day15	day22
1	2	3	4週

olaparib

リムパーザ: 手術不能又は再発乳癌に用いる場合  
本剤の投与を行う場合には、アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤及びタキサン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法歴のある患者を対象とすること。

### <患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WHEIGHT kg 体表面積 \$身体情報<sup>m<sup>2</sup></sup>  
(DuBois式)

### <使用薬剤・投与量>

- olaparib 1回300mgを1日2回投与
- ・ 100mg錠と150mg錠の生物学的同等性は示されていないため、300mgを投与する際には100mg錠を使用しないこと。
  - ・ 副作用が発現した場合には、下の基準を考慮して、休薬・減量すること。

### 副作用発現時の用量調節基準

副作用	程度	処置	再開時の投与量
貧血	ヘモグロビン値がGrade3又は4の場合	ヘモグロビン値 $\geq$ 9g/dlに回復するまで最大4週間休薬する。	減量せずに投与する。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 1回目の再開の場合、減量せずに投与する。</li><li>・ 2回目の再開の場合、1回250mgを1日2回で投与する。</li><li>・ 3回目の再開の場合、1回200mgを1日2回で投与する。</li></ul>
好中球減少	Grade3又は4の場合	Grade1以下に回復するまで休薬する。	
血小板減少	Grade3又は4の場合	Grade1以下に回復するまで最大4週間休薬する。	
上記以外の副作用	Grade3又は4の場合	Grade1以下に回復するまで休薬する。	

### <治療計画>

- 手術不能再発  
開始 年 月 日～治療に対して不応または不耐まで
- 術後補助化学療法  
開始 年 月 日～ 1 年間まで

主治医 指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

