

I D : @PATIENTID @USERSECTION
氏名 : @PATIENTNAME
生年月日 : @PATIENTBIRTH2
性別 : @PATIENTSEXX


綾部市立病院 化学療法
標準プロトコール／治療計画書 [No.M055]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

乳癌 pembrolizumab+w-CBDCA+w-nab-PTX NAC

<対象>

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの治療切除可能な乳癌患者に対する
術前化学療法
(令和4年9月改訂 ペムブロリズマブ最適使用推進ガイドラインに基づく)

<標準プロトコール>



<注意点>

KEYNOTE 522 試験では、pembrolizumab+CBDCA+PTXとして4コース投与された。
術前にpembrolizumab+CBDCA+PTX → pembrolizumab+EC、
術後にpembrolizumab を投与する

<患者情報>

身長 \$HEIGHT0 cm 体重 \$WHEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²

<使用薬剤・投与量>

ペムブロリズマブ 200 mg/body

カルボプラチン Dose (mg) = $AUC (mg/mL \cdot min) \times \{GFR (mL/min) + 25\}$ ← Calvertの式

$AUC (mg/mL \cdot min) = 1.5$

$GFR (mL/min) =$ []

使用可

○血清クレアチニン値を電子カルテ実装の式に適用したときに得られる推算値(mL/min)

○蓄尿等による実測値(mL/min)

使用不可

×体表面積補正されたeGFR(mL/min/1.73m²)

アブラキサン $80 mg/m^2 \times$ \$身体情報 m² = [] mg ⇨ [] mg

(パクリタキセル注射剤(アルブミン混濁型))

<治療計画>

● 術前化学療法

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ 4コース

主治医 [] 指導医 []

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

