

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法  
標準プロトコル／治療計画書 [No.217]  
当レジメンの2022年度実施状況: 5件


## 大腸 FTD-TPI + bevacizumab

### <対象>

切除不能進行再発大腸癌

### <標準プロトコル>

4週を1コースとして繰り返す



bevacizumab : 5mg/kg (day 1, 15)

FTD-TPI □ : 35mg/m<sup>2</sup>/day (day 1~5, day 8~12)

(TFTD, TAS-102)

### <患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m<sup>2</sup>  
(DuBois式)

### <使用薬剤・投与量>

ベバシズマブ 5mg/kg ⇨ mg

FTD-TPI 基準投与量は下記表参照  
(TFTD, TAS-102)

体表面積 m <sup>2</sup>	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.07未満	35mg/回 (70mg/日)
1.07以上~1.23未満	40mg/回 (80mg/日)
1.23以上~1.38未満	45mg/回 (90mg/日)
1.38以上~1.53未満	50mg/回 (100mg/日)
1.53以上~1.69未満	55mg/回 (110mg/日)

体表面積 m <sup>2</sup>	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.69以上~1.84未満	60mg/回 (120mg/日)
1.84以上~1.99未満	65mg/回 (130mg/日)
1.99以上~2.15未満	70mg/回 (140mg/日)
2.15以上	75mg/回 (150mg/日)

※右表に続く

### <治療計画>

#### ● 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医 指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。