

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法

標準プロトコール／治療計画書 [No.261]


当レジメンの2022年度実施状況: 0件

肺 nivolumab + CDDP + PEM(CM816-NAC, CM227)

<対象>

- ・非小細胞肺癌のうち非扁平上皮癌であるもの
- ・臨床病期 I B(腫瘍径が4 cm 以上)、II 又は III A の非小細胞肺癌(ただし、EGFR 遺伝子変異又は ALK 融合遺伝子陽性であることが確認されている患者は除く)の術前患者

<標準プロトコール>



7日前までに
メチコパール2A 筋注

※day2,3は、水分を
1000mL/dayで経口摂取することを患者に説明する

メチコパール2A
最終投与から
22日目まで
9週毎に筋注

<注意点、副作用>

●術前化学療法として用いる場合

CheckMate816試験では、本レジメンを3コース施行後に手術。

その後必要に応じて白金製剤 (CDDPまたはCBDCA) + PEM、PTX、VNRまたはDOCを4コース施行した。

●切除不能進行再発例に用いる場合

CheckMate 227試験ではnivolumabの投与期間は2年間であった。

本レジメンを4コース施行後は、「No.268 肺 nivolumab maintenance 360mg/body q3w」を施行すること。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²

<使用薬剤・投与量>

ニボルマブ 360 mg/body

ペメトレキセド 500 mg/m² × \$身体情報 体表面積 m² = [] mg ⇨ [] mg

シスプラチン 75 mg/m² × \$身体情報 体表面積 m² = [] mg ⇨ [] mg

<治療計画> ※使用する対象を下記から選択してください。

術前化学療法

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ 3 コース

切除不能進行再発

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ 4 コース

主治医 []

指導医 []

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

20230428 v3.0

