

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.295]

当レジメンの2022年度実施状況: 2件


胃 XELOX + nivolumab

<対象>

- 化学療法歴のないHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌患者
- 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が確立されておらず、本剤の投与対象とならない。
 - ・一次治療及び二次治療を受けていない患者に対する本剤の単独投与
 - ・HER2陽性の患者に対する化学療法との併用投与
 - ・術後補助療法としての投与

(令和3年11月改訂のニボルマブ最適使用推進ガイドラインに基づく)

<標準プロトコル>



カペシタビン: 14日間(分2・夕開始)連日経口投与、7日間休薬

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$BSA m²

<使用薬剤・投与量>

カペシタビン

C法: 1000mg/m²

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.36m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 / 2,400mg(8錠)/日
1.36~1.66m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 / 3,000mg(10錠)/日
1.66~1.96m ² 未満	1,800mg(6錠)/回 / 3,600mg(12錠)/日
1.96m ² 以上	2,100mg(7錠)/回 / 4,200mg(14錠)/日

朝・夕
2回

オキサリプラチン 130mg/m² ⇨ mg

ニボルマブ 360mg/body ⇨ 360 mg

<治療計画>

切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

<注意点、副作用>

