

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏 名 : @PATIENTNAME

生 年 月 日 : @PATIENTBIRTH2

性 別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコール／治療計画書 [No.331]
当レジメンの2022年度実施状況: 0 件

肺 erlotinib

<対象>

切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌田GFR
遺伝子変異陽性の切除不能な再発・進行性で、がん化学療法未治療の非小細胞肺癌

<標準プロトコール>

day1	day8	day15	day22
1	2	3	4週

erlotinib

150mgを食事の1時間以上前または食後2時間後に

タルセバ : 1日1回150mgを食事の1時間以上前または食後2時間後に投与する。
(起床時推奨:空腹時に服用する必要あり)

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WHEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²
(DuBois式)

<使用薬剤・投与量>

erlotinib 150mg/日 分1 食事の1時間以上前または食後2時間後に投与する。
(起床時推奨:空腹時に服用する必要あり)

<治療計画>

切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。