

I D : @PATIENTID @USERSECTION
 氏名 : @PATIENTNAME
 生年月日 : @PATIENTBIRTH2
 性別 : @PATIENTSEXN


綾部市立病院 化学療法
 標準プロトコール／治療計画書 [No.358]
 当レジメンの2022年度実施状況: 0件

肺 durvalumab + tremelimumab + CBDCA + GEM(POSEIDON)

<対象>

化学療法歴のない、EGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性の
 切除不能進行・再発の扁平上皮肺癌患者
 (令和4年12月改訂デュルバルマブの最適使用推進ガイドラインおよびPOSEIDON試験に基づく)

<標準プロトコール>



inductionは1コース3週

4コースのみ

<注意点、副作用>

本レジメンを4コース投与後は、「No. 356肺 durvalumab + tremelimumab maintenance (POSEIDON)」を投与すること。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WHEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²

<使用薬剤・投与量>

デュルバルマブ 1500mg /body

トレメリムマブ 75mg /body

ゲムシタピン 1000mg /m² × \$身体情報 体表面積 m² = [] mg ⇔ [] mg

カルボプラチン Dose (mg) = AUC (mg/mL・min) × [GFR (mL/min) + 25] ← Calvertの式

AUC (mg/mL・min) = 5 または 6

GFR (mL/min) = [] ⇔ [] mg

使用可

○血清クレアチニン値を電子カルテ実装の式に適用したときに得られる推算値(mL/min)

○蓄尿等による実測値(mL/min)

使用不可

×体表面積補正されたeGFR(mL/min/1.73m²)

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ [] 4コース

主治医 []

指導医 []

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

