

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法

標準プロトコール／治療計画書 [No.360]


当レジメンの2022年度実施状況: 0件

肺 durvalumab + tremelimumab + CBDCA + PEM(POSEIDON)

<対象>

化学療法歴のない、EGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性の
切除不能進行・再発の非扁平上皮肺癌患者
(令和4年12月改訂デュルバルマブの最適使用推進ガイドラインおよびPOSEIDON試験に基づく)

<標準プロトコール>



inductionは1コース3週

4コースのみ

<注意点、副作用>

本レジメンを4コース投与後は、「No. 361肺 durvalumab + tremelimumab + PEM maintenance (POSEIDON)」を投与すること。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²

<使用薬剤・投与量>

デュルバルマブ 1500mg /body

トレメリムマブ 75mg /body

ペメトレキセド 500mg /m² × \$身体情報 体表面積 m² = [] mg ⇨ [] mg

カルボプラチン Dose (mg) = AUC (mg/mL・min) × [GFR (mL/min) + 25] ← Calvertの式

AUC (mg/mL・min) = 5 5 または 6

GFR (mL/min) = [] ⇨ [] mg

使用可

○血清クレアチニン値を電子カルテ実装の式に適用したときに得られる推算値 (mL/min)

○蓄尿等による実測値 (mL/min)

使用不可

× 体表面積補正されたeGFR (mL/min/1.73m²)

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ [] 4コース

主治医 []

指導医 []

