

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.M040]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

乳腺 pembrolizumab+EC NAC (KN522)

<対象>

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの治癒切除可能な乳癌患者に対する
術前化学療法

(令和4年9月改訂 ペムブロリズマブ最適使用推進ガイドラインに基づく)

<標準プロトコル>



エピルビシン



シクロホスファミド



ペムブロリズマブ



※別途オーダーが必要

2日目から	・デカドロン(4mg) 2錠 ・ガスター錠 2錠	} 分2(朝・夕)×4日間 分1(起床時)×2日間
4日目から	・アプレピタント(80mg) 1錠	

KEYNOTE 522 試験では、4コース投与された。

術前にpembrolizumab+CBDCA+PTX → pembrolizumab+EC、術後にpembrolizumab を投与する。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²
(DuBois式)

<使用薬剤・投与量>

エピルビシン 90mg / m² ⇒ [] mg

シクロホスファミド 600mg / m² ⇒ [] mg

ペムブロリズマブ 200mg / body

<治療計画>

術前化学療法

開始 [] 年 [] 月 [] 日 ~ 4 コース

主治医 [] 指導医 []

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。