

I D : @PATIENTID @USERSECTION
氏 名 : @PATIENTNAME
生 年 月 日 : @PATIENTBIRTH2
性 別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.M061]
当レジメンの2024年度実施状況: 0 件

乳腺 capecitabine adj.

<対象>

- 術前化学療法で病理的完全奏効(pCR)を得られなかった
HER2陰性の乳癌患者に対する術後補助化学療法

<標準プロトコル>

	day1	day8	day15
	1	2	3
capecitabine	2週間投与		1週間休薬
(内分泌療法)	3週間投与		

- CREATE-X試験では、ホルモン受容体陽性乳癌では以下の様に内分泌療法を併用した。
閉経前:5年間のTAM、TOR±GnRHアナログ
閉経後:5年間のAI、TAM、またはTOR

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²
(DuBois式)

<使用薬剤・投与量>

capecitabine 1回1250mg/2を1日2回投与
B法:
体表面積 1回用量
1.33m²未満 1,500mg
1.33m²以上1.57m²未満 1,800mg
1.57m²以上1.81m²未満 2,100mg
1.81m²以上 2,400mg

<治療計画>

☐ 術後補助化学療法

開始 年 月 日 ~ 1 年間まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。