

I D : @PATIENTID @USERSECTION
 氏名 : @PATIENTNAME
 生年月日 : @PATIENTBIRTH2
 性別 : @PATIENTSEXN


綾部市立病院 化学療法
 標準プロトコル／治療計画書 [No.162]
 当レジメンの2022年度実施状況: 0件

大腸 mXELIRI + bevacizumab

<対象>

切除不能進行再発大腸癌

<標準プロトコル>



カペシタピン: 14日間(分2・夕開始)連日経口投与、7日間休薬

<注意点、副作用>

1. カペシタピンの投与量は800mg/m²/回であり、大腸XELOX等での投与量1000mg/m²/回と異なることに注意
2. イリノテカンの投与量(1日1回、200mg/m²を3週間間隔で)は承認用量(1日1回、150mg/m²を2週間間隔で)を超えている。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$BSA m²

<使用薬剤・投与量>

カペシタピン
 E法: 800mg/m²

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.31m ² 未満	900mg(3錠)/回 / 1,800mg(6錠)/日
1.31~1.69m ² 未満	1,200mg(4錠)/回 / 2,400mg(8錠)/日
1.69~2.07m ² 未満	1,500mg(5錠)/回 / 3,000mg(10錠)/日
2.07m ² 以上	1,800mg(6錠)/回 / 3,600mg(12錠)/日

朝・夕
2回

イリノテカン 200mg/m² ⇒ mg

ベバシズマブ 7.5mg/kg ⇒ mg

<治療計画>

- 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。