

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏 名 : @PATIENTNAME

生年月日: @PATIENTBIRTH2

性 別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法

標準プロトコル／治療計画書 [No.381]


当レジメンの2024年度実施状況: 0 件

肺 amivantamab+CBDCA+PEM (80kg≤BW)

<対象>

EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

<標準プロトコル>



7日前までに
メチコパール 2A 筋注

4コースのみ



メチコパール
2A 筋注



メチコパール2A
最終投与から
22日目まで
9週毎に筋注

<注意点>

1. 本レジメンを4コース投与後は、「No.383 肺 amivantamab+PEM(80kg≤BW)」を投与すること。

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$BSA m²

<使用薬剤・投与量>

アミバンタマブ

day1 350mg/body day2 1400mg/body
day8,15 1750mg/body day22 1750mg/body
day43,52 2100mg/body

カルボプラチン

Dose (mg) = $\frac{AUC (mg/mL \cdot min)}{GFR (mL/min) + 25}$ ←Calvertの式

$AUC (mg/mL \cdot min) = 5$

$GFR (mL/min) =$

使用可

○血清クレアチニン値を電子カルテ実装の式に適用したときに得られる推算値(mL/min)

○蓄尿等による実測値(mL/min)

使用不可

×体表面積補正されたeGFR(mL/min/1.73m²)

ペメトレキセド

500 mg/m² × \$BSA m² = mg ⇒ mg

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 4 コース

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

