I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.388]

当レジメンの2024年度実施状況: 0 件

尿路上皮 erdafitinib

<対象>

がん化学療法後に増悪したFGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子を有する根治切除不能な尿路上皮癌

<標準プロトコル>

1コース目

day1	day8	day15 *	day22
1	2	3	4週

erdafitinib

8mg/日

9mg/日

エルダフィチニブ : 1日1回8mgを2週間経口投与し、
それ以降は1日1回9mgを経口投与

* : 投与2週間後の血清リン濃度が9mg/dL以上の場合、
本剤の増量は行わないこと。

<注意点>

- ・定期的に眼科検査を行うなど観察を十分に行うこと。(網膜剥離及び角膜障害があらわれることがある)
- ・定期的に血清リン濃度を測定し、血清リン濃度の変動に注意すること。(高リン血症があらわれることがある)
投与2週間後の血清リン濃度が9mg/dL以上の場合、本剤の増量は行わないこと。
- ・定期的に腎機能検査を行うこと。(急性腎障害があらわれることがある)

<使用薬剤・投与量>

エルダフィチニブ ●用量

- ・1日1回8mgを2週間経口投与し、それ以降は1日1回9mgを経口投与する。
- ・投与2週間後の血清リン濃度が9mg/dL以上の場合、本剤の増量は行わないこと。

●副作用への対応

- ・眼障害、高リン血症、爪障害、その他について減量・休薬を考慮すること

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。